



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

Правила оказания первой медицинской помощи детям

PROFILAKTICA.RU



Центр общественного
здравья и медицинской
профилактики




ЕКАТЕРИНБУРГ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ



СОДЕРЖАНИЕ



| | |
|---|----|
| Ожог | 2 |
| Отморожение | 3 |
| Отравление лекарственными препаратами | 4 |
| Отравление средствами бытовой химии | 5 |
| Отравление уксусной эссенцией и марганцем | 6 |
| Переломы | 7 |
| Ранения | 10 |
| Солнечный и тепловой удар | 11 |
| Удушье | 12 |
| Укус насекомого | 14 |
| Утопление | 14 |
| Ушибы и растяжения | 16 |
| Черепно-мозговая травма | 18 |
| Электротравма | 19 |



Каждый из нас несет ответственность за жизнь и здоровье детей. Неважно, это будет ваш ребенок, младший брат или сестра, ученик и пр. В жизни могут произойти самые разные события, и к ним надо быть готовым, ведь зачастую дети не осознают, к каким последствиям могут привести их, казалось бы, «безобидные» действия или «интересные» эксперименты.

В этой брошюре собраны правила оказания первой медицинской помощи детям при возникновении различных опасных ситуаций.



Ожог — это одно из опасных повреждений кожи, слизистой оболочки, а также подлежащих тканей, возникающее в результате воздействия более высоких температур (термический ожог).

Симптомы ожога:

- сильная боль;
- покраснение кожи;
- образование пузырей;
- ожоги лица пламенем или паром могут сопровождаться ожогом глотки, горлани, трахеи, при которых нарушается механизм дыхания.

Первая помощь при ожоге:

- ① устраниТЬ действие повреждающего фактора;
- ② поместИТЬ поврежденную поверхность под прохладную проточную воду на 10–15 минут;
- ③ удалИТЬ остатки сгоревшей одежды (не отрывать плотно прилипшие части одежды);


- 
- ④ наложить сухую стерильную повязку. При обширном ожоге – завернуть ребенка в чистую простыню;
 - ⑤ обеспечить доступ свежего воздуха;
 - ⑥ НЕ смазывать ожог маслом или жиром;
 - ⑦ вызвать скорую помощь, нужна срочная госпитализация.

ОТМОРОЖЕНИЕ





Отморожение развивается при воздействии температуры ниже 0 °С. Этому способствует высокая влажность воздуха и ветер. Местному отморожению обычно подвергаются нос, уши, щёки, пальцы рук и ног.

Симптомами местного отморожения могут быть:

- бледность кожи;
 - снижение чувствительности;
 - чувство покалывания и боль.
- 

Первая помощь при отморожении:

- 
- ① заметив побледнение этих частей, ни в коем случае НЕ растирать и не помещать под горячую воду. Важно дать месту отморожения согреться самостоятельно. Например, при отморожении рук нужно одеть сухие варежки;
 - ② дать ребенку теплое питье.





ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Очень часто **отравление лекарственными препаратами** у детей происходит за счет банального любопытства: лекарства имеют яркую, хрустящую упаковку, таблетки имеют сладкую оболочку и похожи на конфеты. Поэтому все лекарства нужно держать в недоступном для ребенка месте, и не оставлять ребенка на длительное время без присмотра.

Симптомы отравления лекарственными препаратами:

- необычная сонливость;
- заторможенность;
- шаткая походка;
- вялость, слабость или наоборот, повышенная возбудимость;
- бледность;
- покраснение кожи.



При отравлении лекарственными препаратами необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь!

До приезда врача нужно:

- ① промыть желудок ребенка – дать выпить подряд 1–2 стакана воды;
- ② затем, раздражая пальцем или чайной ложкой корень языка, вызвать рвоту;
- ③ необходимо проверить, осталась ли в квартире вскрытая упаковка из-под лекарственных средств, которые мог достать и проглотить ребенок. Знание названия препарата, вызвавшего отравление, поможет врачу определиться с тактикой и объемом лечения.

Перед применением лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. В случае самостоятельного лечения, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к каждому лекарственному препарату и соблюдать ограничения по возрасту и дозировке, которые там указаны.



ОТРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ

Средства бытовой химии – это все чистящие средства, жидкости для мытья посуды, шампуни, лосьоны и пр. За счет того, что они упакованы в красочные емкости, вкусно пахнут яблоком, медом, шоколадом и другими отдушками, это привлекает внимание маленького ребенка. Поэтому нужно хранить все средства плотно закрытыми в недоступных для ребенка местах, а также не оставлять ребенка одного в ванной или на кухне.

Симптомы отравления бытовой химией:

- тошнота, рвота;
- повышенное слюноотделение;
- возможен ожог полости рта, который проявляется покраснением и воспалением слизистой.

Первая помощь при отравлении средствами бытовой химии:

- ① если ребенок случайно употребил какое-либо бытовое средство, необходимо срочно вызывать скорую медицинскую помощь!
- ② обязательно показать врачу (и в случае госпитализации взять с собой) этикетку от средства, которым предположительно отравился ребенок. Знание состава средства поможет доктору определить тактику и объем терапии.





ОТРАВЛЕНИЕ УКСУСНОЙ ЭССЕНЦИЕЙ И МАРГАНЦЕМ

Отравления уксусной эссенцией и раствором или кристаллами марганца происходят достаточно часто, несмотря на то, что они неприятны на вкус. Дело в том, что даже маленькие объемы этих веществ, попавшие на слизистую полости рта и пищевода, вызывают тяжелые ожоги. Ожог пищевода может в дальнейшем привести к рубцовому сужению органа и потребовать серьезного оперативного лечения. Поэтому уксусную эссенцию и марганец необходимо держать в плотно закрытой посуде в недоступном для ребенка месте, например, в высоком шкафу, до которого он не сможет дотянуться.

Симптомы отравления уксусной эссенцией:

- сильная боль;
- осиплость голоса;
- слюнотечение;
- боль при глотании;
- белый обложенный язык.



Если ребенок случайно выпил уксусную эссенцию:

- ① НЕЛЬЗЯ промывать желудок, НЕЛЬЗЯ ничего заливать;
- ② немедленно вызывать скорую медицинскую помощь!



Симптомы отравления марганцем:

- сильная боль;
- боль при глотании;
- яркий красный или малиновый язык.

Если ребенок отравился марганцем:

- ① дать аскорбиновую кислоту;
- ② немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.




ПЕРЕЛОМЫ

Переломы костей могут быть закрытыми и открытыми, без смещения и со смещением костных отломков.



Симптомы перелома:

- в момент травмы возникает сильная боль;
- появление припухлости и кровоизлияния над переломом;
- деформация и нарушение функции конечности;
- при открытых переломах – рваная рана с видимыми отломками кости.




Первая помощь:


- ① ребенку нужно дать обезболивающее, успокоить;
- ② остановить кровотечение;
- ③ наложить чистую повязку;
- ④ срочно вызвать бригаду скорой помощи, или самостоятельно везти ребенка в травматологический пункт, в травматологическое отделение;
- ⑤ если нет возможности вызвать скорую, наложить транспортную иммобилизацию конечности. Иммобилизация осуществляется посредством наложения шин или фиксации конечности к телу. Если нет шины, можно использовать дощечки, твердый картон с прокладками из мягкого материала. При выраженной деформации конечности не надо пытаться выпрямить её путем




вытяжения, не применять силу, а зафиксировать конечность в том положении, в котором она была обнаружена. Шина должна обездвиживать один сустав выше и все суставы ниже места предполагаемого перелома. После наложения шины нужно проверить пульс ниже места наложения шины. В случае открытого перелома не вправлять в рану отломки костей.



Пример наложения самодельной шины:



Перелом позвоночника – наиболее часто у детей встречаются неосложненные компрессионные переломы тел позвонков. Возникают в результате падения с высоты на ягодицы, пятки или при падении на спину с форсированным (максимальным) сгибанием.



Симптомы перелома позвоночника:

- боль в спине, которая усиливается при движениях (особенно при сгибании);
- задержка дыхания;
- болезненность при нажатии в области перелома.

Первая помощь при переломе позвоночника:

- ① обезболить;
- ② уложить на жесткий щит. Укладывание и снятие производят осторожно, не сгибая позвоночник;
- ③ организовать щадящую транспортировку в травматологическое отделение при невозможности приезда скорой помощи.

Переломы костей таза возникают в результате ДТП, падения ребенка с большой высоты или падения на область таза тяжелых предметов (футбольные ворота, качели).


Симптомы перелома костей таза:

- боль в области перелома;
- болезненность при сжатии таза с боков, при давлении на лонное сочленение, симптом «прилипшей пятки» (пострадавший не может активно поднять вытянутую ногу, подтягивает ее к туловищу), вынужденное положение ребенка: ноги согнуты в коленях и отведены;
- переломы таза могут сопровождаться кровоизлиянием во внутритазовую клетчатку, травматическим шоком.

Первая помощь при переломе костей таза:

- ① обезболить;
- ② организовать щадящую транспортировку на жестком щите, ноги полусогнуты и слегка разведены, под колени укладывают плотный валик из одеяла, одежды;
- ③ доставить в травматологическое отделение.

Пример транспортировки пострадавшего при переломе костей таза:



РАНЕНИЯ

Ранения (разрывы) мягких тканей возникают при механическом воздействии внешних предметов.



Первая помощь при ранении:

- ① промыть рану 3% раствором перекиси водорода;
- ② закрыть стерильной салфеткой;
- ③ наложить повязку.

При серьезных ранениях:

- ① остановить кровотечение;
- ② при сильном кровотечении зажать рану, наложить давящую повязку (при артериальном кровотечении наложить жгут выше раны), приподнять поврежденную часть тела;
- ③ иммобилизовать (зафиксировать) поврежденную конечность;
- ④ срочно вызвать скорую помощь или самостоятельно отвезти ребенка в травмпункт, в хирургическое отделение.



Солнечный и тепловой удар

Солнечный и тепловой удар – болезненное состояние, вызванное перегревом головы прямыми солнечными лучами и общим перегреванием тела. Наиболее подвержены перегреванию светловолосые дети с бледной, нежной кожей. Перегреванию тела способствует все, что нарушает выделение пота или затрудняет испарение пота. Тепловые удары случаются не только в жаркую погоду, но происходят также в помещениях в результате длительного воздействия высокой температуры.

Поэтому важно следить, чтобы летом ребенок всегда был на улице в головном уборе и не находился на солнце долгое время, особенно в дневные часы.

Симптомы солнечного и теплового удара:

- покраснение лица;
- сильная головная боль;
- тошнота, рвота;
- головокружение;
- потемнение в глазах;
- шум в ушах;
- сильная жажда;
- одышка;
- тошнота и рвота;
- вялость;
- повышение температуры до 38–40 °C;
- судороги, возбуждение, бред, потеря сознания.

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе:

- ① ребенка следует перенести в прохладное, затемненное, но хорошо проветриваемое помещение;



- (2) раздеть, уложить;
- (3) положить лед, завернутый в полотенце, или холодный компресс на голову и на крупные сосуды: на шею, область подмышек, паховых складок;
- (4) обеспечить холодные обтирания, холодное питье;
- (5) в экстренных случаях, когда ребенок потерял сознание, отсутствует дыхание и не прощупывается пульс, необходимо приступить к проведению искусственного дыхания и закрытого массажа сердца;
- (6) пострадавшие от теплового и солнечного удара в зависимости от тяжести состояния госпитализируются.



Удушье

Удушье — это частичная или полная закупорка дыхательных путей, возникающая вследствие попадания в них инородного предмета, разговоров во время приема пищи, слишком быстрого приема пищи и пр.

Симптомы удушья:

- ребенок не может говорить, плакать;
- глаза широко распахнуты;
- инстинктивные попытки дотронуться до горла;
- обильное слюноотделение;
- рот открывается в судорожных попытках глотнуть воздух;
- лицо сначала краснеет, потом приобретает синюшный оттенок;
- потеря сознания.

Если ребенок не может дышать и говорить, цвет лица приобретает синюшный оттенок, — нужно немедленно вызвать скорую помощь и приступить к оказанию первой помощи.


Первая помощь ребенку до 1 года:

- ① положить ребенка себе на предплечье, фиксируя голову пальцами, лицом вниз, наклонить руку так, чтобы его голова была ниже тела;
- ② основанием ладони совершить 5 ударов в межлопаточную область, удары направлены к голове ребенка;
- ③ в таком же положении перевернуть ребенка на спину, расположить себе на бедро;
- ④ в нижнюю треть грудины двумя пальцами произвести 5 толчков, направленных к голове.



Первая помощь ребенку старше 1 года:


- ① встать сбоку от ребенка, наклонить его немного вперед, произвести 5 ударов в межлопаточную область;
- ② встать сзади, на уровне ребенка. Обхватить ребенка: одну руку сжать в кулак, приложить ее к животу между пупком и ребрами. Второй рукой обхватить кулак;
- ③ произвести толчки по направлению к себе и вверх 5 раз;
- ④ если не помогает — чередовать 5 ударов и 5 толчков.






УКУС НАСЕКОМОГО

Человек может вынести более 100 укусов насекомых, но у людей с повышенной чувствительностью организма даже один укус может вызвать смерть. Наибольшую опасность представляют укусы медоносной пчелы, осы-шершня, оводов и шмелей.



Симптомы укуса насекомого:

- покраснение, отек в месте укуса;
- повышение температуры тела;
- при множественных укусах — недомогание, головокружение, головная боль, тошнота, рвота, озноб;
- возможны токсические проявления и признаки аллергии: высыпания на коже, отек, нарушение дыхания, частое сердцебиение, судороги, потеря сознания, боли в пояснице, суставах, области сердца.



Первая помощь при укусе насекомого:

- ① удалить жало насекомого из ранки;
- ② обработать ранку спиртовым или полуспиртовым раствором;
- ③ положить пузырь со льдом на место укуса;
- ④ дать пострадавшему антигистаминный препарат;
- ⑤ при развитии анафилактического шока — срочно вызывать реанимационную бригаду скорой помощи.



Утопление


Утопление — это вид механического удушья, которое может наступать в результате заполнения легких жидкостью. Никогда не оставляйте детей на берегу водоема и в воде без присмотра!

Симптомы утопления:

- нарушение сознания;
- нарушение дыхания;
- нарушение работы сердца.

Первая помощь при утоплении:

- 1 проверить пульс, очистить полость рта;
- 2 если ребенок без сознания, но есть дыхание – нужно придать ему соответствующее положение (маленького ребенка держать за ножки головой вниз, придерживая при этом спину и живот, подростка – уложить животом на твердый выпуклый предмет (на согнутые колени человека) с опущенной головой и произвести массаж грудной клетки, пока не удалится вода;
- 3 если ребенок без сознания и не дышит:
 - уложите ребенка на спину;
 - задержите свое дыхание и обхватите губами рот ребенка, детям до 1 года своими губами следует обхватывать и нос, и рот одновременно;
 - медленно и аккуратно вдуйте воздух в рот, следя, чтобы грудная клетка поднималась. Объем вдыхаемого воздуха не должен быть больше того, который у вас сохраняется во рту, так как больший объем воздуха может травмировать легкие ребенка;
 - удерживая запрокинутую голову и приподнятый подбородок, освободите рот ребенка и следите за тем, как воздух выходит из его грудной клетки;
 - повторите всю процедуру 5 раз.
 - Далее приступите к непрямому массажу сердца:
для старших детей: положите на низ грудины ладонь одной руки, а поверх ее ладонь другой руки, для младших детей: вдоль продольной оси грудины положите основание правой руки на область, где ребра соединяются с грудиной. Младенцам надавливания следует выполнять при помощи двух пальцев одной руки.



надавливать на тело так, чтобы грудная клетка опускалась на 1/3;
проводить 30 ритмичных толчков грудной клетки;
далее чередовать компрессии (нажатия) и вдохи в соотношении 15/2;
параллельно с оказанием первой помощи вызывать бригаду скорой медицинской помощи!

Пример положения пострадавшего во время первой помощи при утоплении:



Ушибы и растяжения

Ушиб – повреждение тканей или органов без нарушения целости кожи непосредственным действием тупого предмета (падение, удар).

Симптомы ушиба:

- боль;
- кровоподтек;
- припухлость.

Ушибы в области суставов могут вызвать кровоизлияние в полость сустава. Отмечается нарушение функции ушибленного органа. Боль в области ушиба обычно умеренная и при небольших травмах проходит

быстро. Но сильные боли возникают при ушибах фаланг пальцев, при кровоизлиянии под ногтевую пластинку.

Первая помощь при ушибе:

- ① обеспечить покой и возвышенное положение ушибленной области;
- ② зафиксировать повязкой;
- ③ приложить холод;
- ④ обратиться в травматологический пункт.




Растяжение — повреждение связок, сухожилий, мышц без нарушения их анатомической непрерывности. Возникает при совершении резкого движения, чаще всего в голеностопном суставе.

Симптомы растяжения:

- интенсивная кратковременная боль, затем светлый промежуток на 1–3 часа, когда ребенок не жалуется, слегка прихрамывает на больную ногу;
- в процессе нагрузки боль нарастает, опора на стопу становится резко болезненной, появляется отек.

Первая помощь при растяжении:

- ① приложить холод;
- ② наложить фиксирующую повязку;
- ③ немедленно обратиться в травматологический пункт.






ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА

Черепно-мозговая травма возникает после сильного удара по голове, после падения с ударом головой. Возможны ушибы, раны головы без повреждения и с повреждением черепа и головного мозга.

Симптомы черепно-мозговой травмы:

- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- вялость;
- сонливость или возбуждение;
- возможна потеря сознания в момент травмы, амнезия событий;
- при тяжелой ЧМТ возможно длительное нарушение сознания (сопор, кома).



Первая помощь при черепно-мозговой травме:

- ① вызвать скорую медицинскую помощь;
- ② при нарушении сознания уложить пострадавшего набок;
- ③ обеспечить проходимость дыхательных путей (вытащить запавший язык, при необходимости очистить полость рта от рвотных масс, крови), повернуть голову пострадавшего на бок;
- ④ при отсутствии самостоятельного дыхания проводить искусственное дыхание;
- ⑤ при наличии ран на голове — обработать их раствором фурацилина, наложить стерильную повязку.

ЭЛЕКТРОТРАВМА

Поражение электрическим током происходит, когда пострадавший непосредственно соприкасается с обнаженным проводом и замыкает электрическую цепь.

Симптомы электротравмы:

- характерно вскрикивание, при котором могут возникать ларингоспазм (внезапное непроизвольное сокращение мускулатуры гортани) и асфиксия (удушье);
- в местах входа и выхода тока развивается отек тканей, образуются знаки тока (раны, кровоизлияния, размозжения и обугливание тканей);
- в легких случаях пострадавший испуган, жалуется на "искры" в глазах, появление светобоязни;
- в более тяжелых случаях отмечаются головная боль, головокружение, иногда тошнота (рвота), судороги, парез языка, мышечные боли, потеря сознания, нарушение сердечной деятельности.

Первая помощь при электротравме:

- ① освободить пострадавшего от воздействия тока: необходимо отключить источник тока (рубильник, пробки) или перерубить провода на разных уровнях топором с деревянной сухой рукояткой. Можно оттащить пострадавшего за ремень или сухую полу одежды, избегая касаний обнаженных конечностей или обуви (в которой есть металлические детали), используя сухую ткань, дерево, пластик;
- ② ребенка уложить, освободить от стесняющей одежды, согреть;
- ③ при отсутствии дыхания и сердцебиения приступить к искусственному дыханию и массажу сердца;
- ④ параллельно вызвать скорую помощь.



номер скорой помощи

103



